




Reduction hyperelliptischer Functionen auf elliptische.

Inaugural-Dissertation

welche mit Genehmigung der

hohen philosophischen Facultät der Universität Breslau

zur Erlangung der Doctorwürde

Dienstag, den 4. April 1882, Vormittags 10¹/₂ Uhr

in der kleinen Aula der Universität

gegen die Herren Opponenten

Friedrich Ripke, Gymnasial-Lehrer in Ohlau.
Otto Röhricht, cand. math.

öffentlich vertheidigen wird

Josef Hanel,





Digitized by the Internet Archive
in 2026

Seinem hochverehrten Lehrer

Herrn Professor Dr. E. Dorn

in Hochachtung und Dankbarkeit

gewidmet

vom Verfasser.



Nach einer Bemerkung von Weierstrass, die Königsberger in seiner Abhandlung: „Ueber die Transformationen zweiten Grades für Abelsche Functionen erster Ordnung (Crelle. Journal Bd. 67, pag. 72 und 73) mittheilt, lassen sich hyperelliptische Functionen auf elliptische reduciren, wenn der zweite Modul der transformirten Θ -Function gleich Null gemacht werden kann. Hermite bezeichnet in seinen Untersuchungen über die Transformation hyperelliptischer Functionen (Théorie de la transformation des fonctions Abéliennes. Comptes rendus 1855) die Modul der ursprünglichen Θ Functionen mit g, h, g^1 , die der transformirten mit G, H, G^1 . Es lassen sich G, H, G^1 als Functionen von g, h, g^1 darstellen; für den mittleren Modul H findet Hermite (Hermite pag. 12) die Gleichung:

$$H = \frac{(cd)_{12} + (ac)_{12}g + 2[bc]_{12} - k]h + (db)_{12}g^1 + (ab)_{12}(h^2 - gg^1)}{(cd)_{23} + (ac)_{23}g + 2(bc)_{23}h + (db)_{23}g^1 + (ab)_{23}(h^2 - gg^1)}$$

wo $(ab)_{ij} = ai bj - aj bi$ etc. ist.

Wenn $H = 0$ sein soll, so muss der Zähler gleich Null sein, und dieser hat die Form:

$$n_1 + n_2 g + n_3 h + n_4 g^1 + n_5 (h^2 - gg^1)$$

Man kann von der Gleichung:

1) $n_1 + n_2 g + n_3 h + n_4 g^1 + n_5 (h^2 - gg^1) = 0$
 wo die n ganze Zahlen sind, ausgehen und untersuchen, ob resp. unter welchen Bedingungen sich eine Transformation finden lässt, die $H = 0$ macht.

Wenn die n einen gemeinsamen Faktor besitzen, so entfernt man ihn, indem man die Gleichung 1) durch ihn dividirt. Es sollen also n_1, n_2, n_3, n_4, n_5 keinen gemeinsamen Faktor haben.

Setzt man nun:

$$\begin{aligned} c_1 d_2 - c_2 d_1 &= n_1 \\ a_1 c_2 - a_2 c_1 &= n_2 \\ 2(b_1 c_2 - b_2 c_1) - k &= n_3 \\ d_1 b_2 - d_2 b_1 &= n_4 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 &= n_5 \end{aligned}$$

so handelt es sich darum zu zeigen, dass sich hieraus stets a_1, b_1, c_1, d_1 und a_2, b_2, c_2, d_2 so bestimmen lassen, dass auch den sonstigen zwischen ihnen bestehenden Bedingungen genügt wird,

Zwischen den Transformationscoefficienten $a_0 \dots$ bestehen die äquivalenten Gleichungssysteme:

$$\begin{aligned}
 & a_0 d_1 + b_0 c_1 - c_0 b_1 - d_0 a_1 = 0 \\
 & a_0 d_2 + b_0 c_2 - c_0 b_2 - d_0 a_2 = 0 \\
 2) \quad & a_0 d_3 + b_0 c_3 - c_0 b_3 - d_0 a_3 = k \\
 & a_1 d_2 + b_1 c_2 - c_1 b_2 - d_1 a_2 = k \\
 & a_1 d_3 + b_1 c_3 - c_1 b_3 - d_1 a_3 = 0 \\
 & a_2 d_3 + b_2 c_3 - c_2 b_3 - d_2 a_3 = 0
 \end{aligned}$$

(Hermite pag. 3) und:

$$\begin{aligned}
 & a_0 b_3 + a_1 b_2 - a_2 b_1 - a_3 b_0 = 0 \\
 & a_0 c_3 + a_1 c_2 - a_2 c_1 - a_3 c_0 = 0 \\
 3) \quad & a_0 d_3 + a_1 d_2 - a_2 d_1 - a_3 d_0 = k \\
 & b_0 c_3 + b_1 c_2 - b_2 c_1 - b_3 c_0 = k \\
 & b_0 d_3 + b_1 d_2 - b_2 d_1 - b_3 d_0 = 0 \\
 & c_0 d_3 + c_1 d_2 - c_2 d_1 - c_3 d_0 = 0
 \end{aligned}$$

(Hermite pag. 7).

Mit Hilfe der 4. Gleichung des Systems 2) lassen sich die Gleichungen zwischen den n und den Coefficienten a, b, c, d in die Form schreiben:

$$\begin{aligned}
 & c_1 d_2 - c_2 d_1 = n_1 \\
 & a_1 c_2 - a_2 c_1 = n_2 \\
 & a_1 d_2 - a_2 d_1 = \frac{k - n_3}{2} \\
 4) \quad & b_1 c_2 - b_2 c_1 = \frac{k + n_3}{2} \\
 & d_1 b_2 - d_2 b_1 = n_4 \\
 & a_1 b_2 - a_2 b_1 = n_5
 \end{aligned}$$

Der Transformationsgrad k ergibt sich aus der 3. und 4. Gleichung durch Multiplication derselben mit einander; es ist nämlich:

$$(a_1 d_2 - a_2 d_1) (b_1 c_2 - b_2 c_1) = \frac{k - n_3}{2} \frac{k + n_3}{2}$$

gleich:

$$(a_1 c_2 - a_2 c_1) (d_2 b_1 - d_1 b_2) + (c_1 d_2 - c_2 d_1) (a_2 b_1 - a_1 b_2) = \frac{k - n_3}{2} \frac{k + n_3}{2}$$

also:

$$5) \quad -n_2 n_4 - n_1 n_5 = \frac{k - n_3}{2} \frac{k + n_3}{2}$$

folglich:

$$k = \sqrt{n_3^2 - 4(n_2 n_4 + n_1 n_5)}$$

Da k eine ganze Zahl sein muss, so muss die Grösse unter dem Wurzelzeichen ein reines Quadrat sein. Diese Bedingung muss von den n erfüllt sein.

Aus dem Gleichungssystem 3) ergeben sich Relationen, die den Gleichungen 4) ähnlich sind, zwischen den n und den Coefficienten mit den Indices 0 und 3, nämlich:

$$\begin{aligned}
 c_3 d_0 - c_0 d_3 &= n_1 \\
 a_3 c_0 - a_0 c_3 &= n_2 \\
 a_0 d_3 - a_3 d_0 &= \frac{k + n_3}{2} \\
 b_0 c_3 - b_3 c_0 &= \frac{k - n_3}{2} \\
 b_0 d_3 - b_3 d_0 &= n_4 \\
 a_3 b_0 - a_0 b_3 &= n_5
 \end{aligned}$$

6)

Aus den Gleichungen 4) und 6) lassen sich sechzehn Relationen ableiten, die ich hier zusammenstellen will, und die später eine häufige Anwendung finden werden. Sie sind:

$$\begin{aligned}
 \alpha) b_0 n_1 + c_0 n_4 - d_0 \frac{k - n_3}{2} &= 0 \\
 \beta) a_0 n_1 + d_0 n_2 + c_0 \frac{k + n_3}{2} &= 0 \\
 \gamma) a_0 n_4 - d_0 n_5 - b_0 \frac{k + n_3}{2} &= 0 \\
 \delta) c_0 n_5 - b_0 n_2 - a_0 \frac{k - n_3}{2} &= 0
 \end{aligned}$$

7)

$$\begin{aligned}
 \alpha) b_1 n_1 + c_1 n_4 + d_1 \frac{k + n_3}{2} &= 0 \\
 \beta) a_1 n_1 + d_1 n_2 - c_1 \frac{k - n_3}{2} &= 0 \\
 \gamma) a_1 n_4 - d_1 n_5 + b_1 \frac{k - n_3}{2} &= 0 \\
 \delta) c_1 n_5 - b_1 n_2 + a_1 \frac{k + n_3}{2} &= 0
 \end{aligned}$$

8)

$$\begin{aligned}
 \alpha) b_2 n_1 + c_2 n_4 + d_2 \frac{k + n_3}{2} &= 0 \\
 \beta) a_2 n_1 + d_2 n_2 - c_2 \frac{k - n_3}{2} &= 0 \\
 \gamma) a_2 n_4 - d_2 n_5 + b_2 \frac{k - n_3}{2} &= 0 \\
 \delta) c_2 n_5 - b_2 n_2 + a_2 \frac{k + n_3}{2} &= 0
 \end{aligned}$$

9)

$$\begin{aligned}
 & \alpha) \ b_3 \ n_1 + c_3 \ n_4 - d_3 \frac{k - n_3}{2} = 0 \\
 & \beta) \ a_3 \ n_1 + d_3 \ n_2 + c_3 \frac{k + n_3}{2} = 0 \\
 & \gamma) \ a_3 \ n_4 - d_3 \ n_5 - b_3 \frac{k + n_3}{2} = 0 \\
 & \delta) \ c_3 \ n_5 - b_3 \ n_2 - a_3 \frac{k - n_3}{2} = 0
 \end{aligned}$$

10) Ich beweise nun, dass die Gleichungen 4) stets in ganzen Zahlen auflösbar sind, wenn n_1, n_2, n_3, n_4, n_5 ganze Zahlen sind, die der Bedingung genügen:

$$n_3^2 - 4(n_2 n_4 + n_1 n_5) = k^2$$

Ich nehme d_1 und d_2 so an, dass sie den grössten gemeinsamen Teiler χ von n_1, n_4 und $\frac{k-n_3}{2}$ enthalten, sonst aber weiter keinen besitzen. Enthielte d_1 oder d_2 einen Teiler δ von χ nicht, so würde aus den Gleichungen α, β, γ von 8) resp. 9) folgen, dass derselbe in $\frac{k+n_3}{2}, n_2$ und n_5 enthalten sein müsste. Es hätten dann n_1, n_2, n_3, n_4, n_5 einen gemeinsamen Faktor; dies ist aber der über die n gemachten Annahme zuwider. Demnach müssen d_1 und d_2 durch δ teilbar sein.

Die 1., 3. und 5. Gleichung von 4) werden nun ganzzahlig aufgelöst. Sind irgend welche Lösungen derselben

$\alpha_1, \alpha_2; \beta_1, \beta_2; \gamma_1, \gamma_2;$
so sind alle Lösungen enthalten in:

$$\begin{aligned}
 & \alpha_1 + m_1 \frac{d_1}{\chi}, \quad \alpha_2 + m_1 \frac{d_2}{\chi}; \\
 & \beta_1 + m_2 \frac{d_1}{\chi}, \quad \beta_2 + m_2 \frac{d_2}{\chi}; \\
 & \gamma_1 + m_3 \frac{d_1}{\chi}, \quad \gamma_2 + m_3 \frac{d_2}{\chi};
 \end{aligned}$$

wo m_1, m_2, m_3 vorläufig beliebige ganze Zahlen bedeuten.

Geht man mit diesen Lösungen in die 2. Gleichung des Systems 4), so erhält man:

$$\left(\alpha_1 + m_1 \frac{d_1}{\chi}\right)\left(\gamma_2 + m_3 \frac{d_2}{\chi}\right) - \left(\alpha_2 + m_1 \frac{d_2}{\chi}\right)\left(\gamma_1 + m_3 \frac{d_1}{\chi}\right) = n_2$$

oder:

$$\alpha_1 \gamma_2 - \alpha_2 \gamma_1 + m_1 \left(\gamma_2 \frac{d_1}{\chi} - \gamma_1 \frac{d_2}{\chi}\right) + m_3 \left(\alpha_1 \frac{d_2}{\chi} - \alpha_2 \frac{d_1}{\chi}\right) = n_2$$

gleich:

$$\alpha_1 \gamma_2 - \alpha_2 \gamma_1 - m_1 \frac{n_1}{\chi} + m_3 \frac{k - n_3}{2 \chi} = n_2$$

Daher ist:

$$11) - m_1 \frac{n_1}{\chi} + m_3 \frac{k - n_3}{2 \chi} = n_2 - (\alpha_1 \gamma_2 - \alpha_2 \gamma_1)$$

Ebenso erhält man aus der letzten Gleichung:

$$12) m_1 \frac{n_4}{\chi} + m_2 \frac{k - n_3}{2 \chi} = n_5 - (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1)$$

Damit die Gleichung 11) ganzzahlig lösbar ist, muss ein etwaiger gemeinsamer Faktor ψ von $\frac{n_1}{\chi}$ und $\frac{k - n_3}{2 \chi}$ auch in $n_2 - (\alpha_1 \gamma_2 - \alpha_2 \gamma_1)$ enthalten sein. Dividirt man zum Nachweise hievon die Gleichung 5) durch χ , so erhält man:

$$- n_2 \frac{n_4}{\chi} - n_5 \frac{n_1}{\chi} = \frac{k - n_3}{2 \chi} \cdot \frac{k + n_3}{2}$$

Es muss also der $\frac{n_1}{\chi}$ und $\frac{k - n_3}{2 \chi}$ gemeinsame Faktor auch in $n_2 \frac{n_4}{\chi}$ enthalten sein, also in n_2 , da $\frac{n_1}{\chi}$, $\frac{n_4}{\chi}$ und $\frac{k - n_3}{2 \chi}$ keinen gemeinsamen Faktor mehr besitzen.

Ferner ist wegen der 1. und 3. Gleichung

$$\begin{aligned} \gamma_1 \frac{d_2}{\chi} - \gamma_2 \frac{d_1}{\chi} &= \frac{n_1}{\chi} \\ \alpha_1 \frac{d_2}{\chi} - \alpha_2 \frac{d_1}{\chi} &= \frac{k - n_3}{2 \chi} \end{aligned}$$

Der den rechten Seiten gemeinsame Faktor muss auch ein Faktor der Determinante $\alpha_1 \gamma_2 - \alpha_2 \gamma_1$ sein, weil $\frac{d_1}{\chi}$ und $\frac{d_2}{\chi}$ relativ prim sind.

Aehnlich wird die ganzzahlige Lösbarkeit von 12) bewiesen.

Ist nun μ_1, μ_3 eine Lösung von 11), so sind, wenn p eine ganze Zahl ist, die sämtlichen Lösungen:

$$\mu_1 + p \frac{k - n_3}{2 \chi \psi}, \quad \mu_3 + p \frac{n_1}{\chi \psi}$$

Setzt man den Wert von m_1 in 12) ein, so erhält man:

$$\left(\mu_1 + p \frac{k - n_3}{2 \chi \psi} \right) \frac{n_4}{\chi} + m_2 \frac{k - n_3}{2 \chi} = n_5 - (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1)$$

gleich:

$$13) p \frac{k - n_3}{2 \chi \psi} \cdot \frac{n_4}{\chi} + m_2 \frac{k - n_3}{2 \chi} = n_5 - (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1) - \mu_1 \frac{n_4}{\chi}$$

Damit sich aus dieser Gleichung ganzzahlige Lösungen von m_2 und p ergeben, muss die rechte Seite durch $\frac{k - n_3}{2 \chi \psi}$ teilbar sein. Um dies zu zeigen, substituirt man den aus 11) folgenden Wert für μ_1 , nämlich:

$$\mu_1 = \frac{-n_2 + (\alpha_1 \gamma_2 - \alpha_2 \gamma_1) + \mu_3 \frac{k - n_3}{2 \chi}}{\frac{n_1}{\chi}}$$

und findet:

$$\begin{aligned} n_5 &= (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1) - \mu_1 \frac{n_4}{\chi} \\ &= n_5 - (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1) - \frac{n_4}{n_1} \left\{ -n_2 + (\alpha_1 \gamma_2 - \alpha_2 \gamma_1) + \mu_3 \frac{k - n_3}{2 \chi} \right\} \\ &= \frac{1}{n_1} \left\{ n_1 n_5 + n_2 n_4 - n_1 (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1) - n_4 (\alpha_1 \gamma_2 - \alpha_2 \gamma_1 + \mu_3 \frac{k - n_3}{2 \chi}) \right\} \end{aligned}$$

Der Divisor n_1 kann ausser Acht gelassen werden, da er zu $\frac{k - n_3}{2 \chi \psi}$ relativ prim ist. $n_1 n_5 + n_2 n_4$ ist durch $\frac{k - n_3}{2 \chi \psi}$ teilbar wegen Gleichung 5), ebenso das letzte Glied. Setzt man nun in

$- [n_1 (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1) + n_4 (\alpha_1 \gamma_2 - \alpha_2 \gamma_1)]$
 $\gamma_1 d_2 - \gamma_2 d_1$ für n_1 und $\beta_2 d_1 - \beta_1 d_2$ für n_4 , so wird die Grösse in der Klammer gleich:

$$-(\gamma_1 \beta_2 - \gamma_2 \beta_1) \frac{k - n_3}{2}$$

Somit ist die Gleichung 13) nach m_2 und p ganzzahlig lösbar, da $\frac{n_4}{\chi}$ und ψ relativ prim sind.

Es sind somit die 1., 2., 3., 5. und 6. Gleichung von 4) ganzzahlig lösbar; die 4. Gleichung ist auch befriedigt, weil sie eine Folge der übrigen ist

Alle nicht äquivalente Transformationen werden, wenn k eine Primzahl ist, durch folgende vier Grundformen repräsentirt:

$$\text{I} \quad \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k \end{Bmatrix}, \quad \text{II} \quad \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k & i & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k \end{Bmatrix},$$

$$\text{III} \quad \begin{pmatrix} k & i & 0 & i^1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k & -i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{IV} \quad \begin{pmatrix} k & 0 & i & i^1 \\ 0 & k & i^{11} & i \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

worin i, i^1, i^{11} sämtliche Werte $0, 1, 2, \dots, k-1$ annehmen können. Es giebt somit $1 + k + k^2 + k^3$ Transformationsklassen (Hermite pag. 4),

Ich suche nun denjenigen Repräsentanten, mit dem für primzahlige k die Transformationen, die die hyperelliptischen Functionen auf elliptische reduciren, äquivalent sind. Da alle Transformationen, die derselben Klasse angehören, in einander übergehen, wenn man sie mit linearen Transformationen componirt, so muss, wenn die Transformation:

$$\begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \\ b_0 & b_1 & b_2 & b_3 \\ c_0 & c_1 & c_2 & c_3 \\ d_0 & d_1 & d_2 & d_3 \end{pmatrix}$$

in eine der durch obige vier Grundformen repräsentirten Klassen gehören soll, sie aus dem betreffenden Repräsentanten durch Composition mit einer linearen Transformation erhalten werden.

Ich untersuche zunächst, welchen Bedingungen die Coefficienten $a_0, \dots$ und somit auch die n unterworfen sein müssen, damit die Transformation in die von der ersten Grundform repräsentirten Klasse gehört. Es muss sein:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \alpha_0 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_0 & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_0 & \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \\ \delta_0 & \delta_1 & \delta_2 & \delta_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \\ b_0 & b_1 & b_2 & b_3 \\ c_0 & c_1 & c_2 & c_3 \\ d_0 & d_1 & d_2 & d_3 \end{pmatrix}$$

Die Coefficienten der linearen Transformation $\alpha_0, \dots$ genügen den Gleichungen 2) und 3) entsprechenden Gleichungen, in denen aber k durch 1 zu ersetzen ist.

Führt man die Composition auf der linken Seite aus und setzt die entsprechenden Coefficienten auf beiden Seiten gleich, so erhält man:

$$\begin{array}{llll} \alpha_0 = a_0, & \beta_0 = b_0, & k\gamma_0 = c_0, & k\delta_0 = d_0 \\ \alpha_1 = a_1, & \beta_1 = b_1, & k\gamma_1 = c_1, & k\delta_1 = d_1 \\ \alpha_2 = a_2, & \beta_2 = b_2, & k\gamma_2 = c_2, & k\delta_2 = d_2 \\ \alpha_3 = a_3, & \beta_3 = b_3, & k\gamma_3 = c_3, & k\delta_3 = d_3 \end{array}$$

Alle c und d sind somit Vielfache von k und somit, wie man leicht einsieht, wenn man die Werte der Coefficienten c

und d in die Gleichungen 4) und 6) substituirt, auch n_1 , n_2 und n_4 . Aus der Gleichung 5), die man schreiben kann:

$$k^2 + 4 (n_1 n_5 + n_2 n_4) = n_3^2$$

ist ferner ersichtlich, dass, da die linke Seite durch k teilbar ist, auch n_3 durch k teilbar sein muss. Nun besitzen n_3^2 und $k^2 + 4 n_2 n_4$ den Faktor k^2 , daher muss auch $4 n_1 n_5$ Vielfaches von k^2 sein. n_5 darf, da die n keinen gemeinsamen Faktor besitzen sollen, k nicht enthalten; daher muss n_1 durch k^2 teilbar sein.

Wenn also die Transformation mit der 1. Grundform äquivalent sein soll, so muss

$$n_1 \equiv 0 \pmod{k}$$

$$n_2 \equiv 0 \pmod{k}$$

$$n_4 \equiv 0 \pmod{k}$$

sein.

Erfüllen umgekehrt n_1 , n_2 , n_4 diese Bedingung, so können die Transformationen auch nur in die durch die 1. Grundform repräsentirte Klasse gehören; denn aus der Gleichung 5) folgt sofort, dass auch n_3 Vielfaches von k und n_1 von k^2 sein muss, da n_5 den Faktor k nicht enthalten darf. Aus den Gleichungen δ) von 7), 8), 9), 10) geht hervor, dass c_0 , c_1 , c_2 , c_3 Vielfache von k sind, ebenso sind vermöge der Gleichungen α) auch d_0 , d_1 , d_2 , d_3 durch k teilbar, weil bz $n_1 + cz n_4$, worin $x = 0$, 1, 2, 3 ist den Faktor k^2 besitzen.

Sollen die Transformationen einer der durch die 2. Grundform repräsentirten Klassen angehören, so müssen sie gleich gesetzt werden können:

$$\begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k & i & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} \alpha_0 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_0 & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_0 & \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \\ \delta_0 & \delta_1 & \delta_2 & \delta_3 \end{Bmatrix}$$

(Die Coefficienten der linearen Transformationen bezeichne ich der Einfachheit wegen immer mit denselben Buchstaben; bei jeder Composition mit von einander verschiedenen Repräsentanten haben sie aber verschiedene Werte.).

Durch Ausführung der Composition erhält man als notwendige Bedingung:

$$\begin{Bmatrix} \alpha_0 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_0 k + \gamma_0 i & \beta_1 k + \gamma_1 i & \beta_2 k + \gamma_2 i & \beta_3 k + \gamma_3 i \\ \gamma_0 & \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \\ \delta_0 k & \delta_1 k & \delta_2 k & \delta_3 k \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \\ b_0 & b_1 & b_2 & b_3 \\ c_0 & c_1 & c_2 & c_3 \\ d_0 & d_1 & d_2 & d_3 \end{Bmatrix}$$

Die Vergleichung der Coefficienten zeigt, dass die d und somit wegen der Gleichungen 4) n_1 und n_4 und der Gleichung

5) auch n_3 Vielfache von k sein müssen; dass die c dagegen nicht alle durch k teilbar sein dürfen, weil sie den entsprechenden γ gleich sind. Diese können aber keinen gemeinsamen Faktor besitzen, weil die Determinante der Transformation $\alpha_0 \dots$ gleich Eins ist. Daher darf auch der Gleichungen $\delta)$ von 7), 8), 9), 10) wegen n_2 nicht k als Faktor enthalten.

Ferner muss sein:

$$bx = \beta x k + \gamma x i \quad x = 0, 1, 2, 3$$

Führt man in diese Gleichung cx statt γx ein, so folgt zur Bestimmung von i die Congruenz:

$$bx \equiv i cx \pmod{k}$$

die eine und nur eine Lösung, die kleiner als k ist, besitzt. Aus dieser Congruenz folgt:

$$bx cx - bl cx \equiv 0 \pmod{k}$$

und;

$$ax bl - al bx \equiv i (ax cl - al cx) \pmod{k}$$

und als specielle Fälle:

$$n_1 \equiv 0 \text{ und } n_5 \equiv i n_2 \pmod{k}$$

Diese Congruenz ist nach i immer auflösbar, da n_2 zu k relativ prim ist, und i ist durch sie eindeutig bestimmt, weil $i < k$ ist.

Die Transformationen gehören somit zu einer Klasse der 2. Grundform, wenn n_1 und n_4 durch k teilbar sind, n_2 dagegen nicht.

Befriedigen nun n_1 , n_4 und n_2 diese Bedingungen, so sind auch umgekehrt die Transformationen mit der 2. Grundform äquivalent. Es folgt dann nämlich aus der Gleichung 5), dass

auch entweder $\frac{k - n_3}{2}$ oder $\frac{k + n_3}{2}$ durch k teilbar ist,

und weil $\frac{k - n_3}{2} + \frac{k + n_3}{2} = k$ ist, so ist sowohl $\frac{k - n_3}{2}$

als auch $\frac{k + n_3}{2}$ Vielfaches von k . Die Gleichungen $\beta)$ von

7), 8), 9), 10) liefern nun

$$dx \equiv 0 \pmod{k}$$

Dass aber nicht alle c congruent Null nach dem Modul k sein können, geht aus der zweiten Gleichung von 4) und 6) hervor, weil n_2 k nicht enthält.

Damit die Transformationen mit einer Klasse der 3. Grundform äquivalent sind, muss sein:

$$\begin{pmatrix} k & i & 0 & i^1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k & -i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \alpha_0 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_0 & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_0 & \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \\ \delta_0 & \delta_1 & \delta_2 & \delta_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \\ b_0 & b_1 & b_2 & b_3 \\ c_0 & c_1 & c_2 & c_3 \\ d_0 & d_1 & d_2 & d_3 \end{pmatrix}$$

Zwischen den Coefficienten müssen daher die Gleichungen bestehen:

$$\begin{aligned} az &= \alpha z k + \beta z i + \delta z i^1 \\ bz &= \beta z \\ cz &= \gamma z k - \delta z i \\ dz &= \delta z \end{aligned}$$

b und d dürfen also nicht sämtlich k enthalten; i und i^1 sind eindeutige Lösungen der Congruenzen:

$$\begin{aligned} i dz &\equiv -cz \pmod{k} \\ i bz + i^1 dz &\equiv 0 \pmod{k} \end{aligned}$$

Aus der ersten Congruenz folgt:

$$\begin{aligned} cz d\lambda - c\lambda dz &\equiv 0 \pmod{k} \\ \text{daher für } z = 1, \lambda = 2 \\ n_1 &\equiv 0 \pmod{k} \end{aligned}$$

n_4 muss zu k relativ prim sein, weil sonst nach dem Vorhergehenden die Transformationen mit der 2. Grundform äquivalent sein würden. Aus den Congruenzen:

$$\begin{aligned} i dz &\equiv -cz \pmod{k} \\ i bz + i^1 dz &\equiv az \pmod{k} \end{aligned}$$

folgen weiter:

$$\begin{aligned} i (dz b\lambda - d\lambda bz) &\equiv - (cz b\lambda - c\lambda bz) \pmod{k} \\ i^1 (b\lambda dz - bz d\lambda) &\equiv (b\lambda az - bz a\lambda) \pmod{k} \end{aligned}$$

daher für $z = 1, \lambda = 2$.

$$\begin{aligned} i n_4 &\equiv \frac{k + n_3}{2} \pmod{k} \\ i^1 n_4 &\equiv n_5 \pmod{k} \end{aligned}$$

Diese Congruenzen sind eindeutig lösbar, weil n_4 zu k relativ prim ist.

Ist nun $n_1 \equiv 0 \pmod{k}$, n_4 aber nicht, so sind die Transformationen auch mit der 3. Grundform äquivalent; denn die d können nicht sämtlich k als Faktor enthalten, weil sonst auch n_4 k enthalten müsste. Ferner folgt aus den Gleichungen $\alpha)$ von 7), 8), 9), 10), wenn man je zwei combinirt:

$$cz d\lambda - c\lambda dz \equiv 0 \pmod{k}$$

Die Grössen i und i^1 ergeben sich, da n_4 nicht k als Teiler enthält, eindeutig aus den Congruenzen:

$$\begin{aligned} i n_4 &\equiv \frac{k + n_3}{2} \pmod{k} \\ i^1 n_4 &\equiv n_5 \pmod{k} \end{aligned}$$

Wenn endlich die Transformationen zu einer Klasse der 4. Grundform gehören sollen, so müssen ihre Coefficienten die Gleichungen erfüllen:

$$\begin{aligned} a\kappa &= \alpha\kappa k + \gamma\kappa i + \delta\kappa i^1 \\ b\kappa &= \beta\kappa k + \gamma\kappa i^{11} + \delta\kappa i \\ c\kappa &= \gamma\kappa \\ d\kappa &= \delta\kappa \end{aligned}$$

c und d dürfen demnach nicht sämtlich k enthalten. Ferner darf auch nicht sein:

$$c\kappa d\lambda - c\lambda d\kappa \equiv 0 \pmod{k}$$

widrigenfalls die Transformationen mit der 3. Grundform äquivalent sein würden; somit darf auch n_1 durch k nicht teilbar sein. i, i^1, i^{11} sind Lösungen der Congruenzen:

$$\begin{aligned} a\kappa &\equiv c\kappa i + d\kappa i^1 \pmod{k} \\ b\kappa &\equiv c\kappa i^{11} + d\kappa i \pmod{k} \end{aligned}$$

Hieraus folgen:

$$\left. \begin{aligned} a\kappa d\lambda - a\lambda d\kappa &\equiv i (c\kappa d\lambda - c\lambda d\kappa) \\ a\kappa c\lambda - a\lambda c\kappa &\equiv i^1 (d\kappa c\lambda - d\lambda c\kappa) \\ b\kappa c\lambda - b\lambda c\kappa &\equiv i (d\kappa c\lambda - d\lambda c\kappa) \\ b\kappa d\lambda - b\lambda d\kappa &\equiv i^{11} (c\kappa d\lambda - c\lambda d\kappa) \end{aligned} \right\} \pmod{k}$$

Daher für $\kappa = 1, \lambda = 2$

$$\begin{aligned} i n_1 &\equiv \frac{k - n_3}{2} \\ i^1 n_1 &\equiv -n_2 \\ i^{11} n_1 &\equiv -n_4 \end{aligned}$$

Diese Congruenzen ergeben für i, i^1, i^{11} eindeutige Lösungen, weil n_1 zu k relativ prim ist.

Wenn nun umgekehrt n_1 durch k nicht teilbar ist, so besagt dies eben, dass nicht alle Congruenzen;

$$c\kappa d\lambda - c\lambda d\kappa \equiv 0 \pmod{k}$$

erfüllt sind. Somit gehören die Transformationen zu einer Klasse der 4. Grundform. i, i^1, i^{11} folgen aus obigen Congruenzen.

Keine Transformation, welche die Reduction auf elliptische Functionen liefert, kann selbst ein Repräsentant sein. Wenn eine Transformation gleich dem durch die 1. Grundform dargestellten Repräsentanten sein soll, so muss sein:

$$\begin{aligned} a_0 &= 1, & a_1 &= 0, & a_2 &= 0, & a_3 &= 0, \\ b_0 &= 0, & b_1 &= 1, & b_2 &= 0, & b_3 &= 0, \\ c_0 &= 0, & c_1 &= 0, & c_2 &= k, & c_3 &= 0, \\ d_0 &= 0, & d_1 &= 0, & d_2 &= 0, & d_3 &= k. \end{aligned}$$

Die n werden gleich:

$$n_1 = n_2 = n_4 = n_5 = 0, \quad n_3 = k,$$

Dieselben Werte der n ergeben sich, wenn eine Transformation gleich einem in der 2. Grundform enthaltenem Repräsentanten sein soll. In beiden Fällen nimmt die Gleichung 1) die Form an;

$$k h = 0$$

Es müsste demnach schon der mittlere Modul der gegebenen Θ -Function gleich Null sein.

Wenn eine Transformation mit einem Repräsentanten der 3. Grundform identisch sein soll, so müssen die Coefficienten derselben gleich sein:

$$\begin{array}{llll} a_0 = k, & a_1 = i, & a_2 = 0, & a_3 = i^1, \\ b_0 = 0, & b_1 = 1, & b_2 = 0, & b_3 = 0, \\ c_0 = 0, & c_1 = 0, & c_2 = k, & c_3 = -i, \\ d_0 = 0, & d_1 = 0, & d_2 = 0, & d_3 = 1. \end{array}$$

Daher:

$$n_1 = n_4 = n_5 = 0, n_2 = i k, n_3 = k$$

Somit wird die Gleichung 1) nach Fortschaffung des gemeinsamen Faktors k der n :

$$i g + h = 0$$

also

$$n_1 = n_4 = n_5 = 0, n_2 = i, n_3 = 1$$

und:

$$n_3^2 - 4 (n_1 n_5 + n_2 n_4) = 1$$

Es ist demnach schon zur Reduction eine Transformation der Determinante 1 genügend.

Zu demselben Resultat gelangt man, wenn eine Transformation mit einem Repräsentanten der 4. Grundform identisch sein soll. Als Bedingung hierfür findet man;

$$n_1 = n_2 = n_4 = 0, n_3 = k, n_5 = i k$$

Eliminirt man den gemeinsamen Faktor k der n , so wird die Gleichung 1) gleich:

$$h + i (h^2 - g g^1) = 0$$

Auch hier ist:

$$n_3^2 - 4 (n_1 n_5 + n_2 n_4) = 1$$

Eine lineare Transformation ändert aber eine Θ -Function abgesehen von einer Exponentialgrösse, nur um eine multiplicative Constante (Königsberger: Transf. 2. Grades Abelscher Funct. Crelle Bd. 67 pag. 66.)

Daher kann eine Transformation, die hyperelliptische Functionen auf elliptische reducirt, selbst kein Repräsentant der 3. und 4. Grundform sein.

Ist k eine Primzahl, so findet man die Anzahl der äquivalenten Transformationen, die hyperelliptische Functionen auf elliptische reduciren, indem man die Anzahl der linearen Transformationen sucht, die mit den obigen Transformationen componirt alle Transformationen derselben Klasse mit derselben Eigenschaft liefern. Substituirt man die Werte, die die Transformationscoefficienten annehmen, wenn die Transformation mit einer der durch obige vier Grundformen repräsentirten Klassen äquivalent ist, in die Gleichungen 4) und setzt:

$$\begin{aligned}
 & \gamma_1 \delta_2 - \gamma_2 \delta_1 = \nu_1 \\
 & \alpha_1 \gamma_2 - \alpha_2 \gamma_1 = \nu_2 \\
 & \alpha_1 \delta_2 - \alpha_2 \delta_1 = \frac{1 - \nu_3}{2} \\
 & \beta_1 \gamma_2 - \beta_2 \gamma_1 = \frac{1 + \nu_3}{2} \\
 & \delta_1 \beta_2 - \delta_2 \beta_1 = \nu_4 \\
 & \alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1 = \nu_5
 \end{aligned}
 \tag{14}$$

so nehmen diese in den vier verschiedenen Fällen die Gestalt an:

$$\begin{array}{ll}
 \text{I.} & \begin{aligned}
 k^2 \nu_1 &= n_1 \\
 k \nu_2 &= n_2 \\
 k \frac{1 - \nu_3}{2} &= \frac{k - n_3}{2} \\
 k \frac{1 + \nu_3}{2} &= \frac{k + n_3}{2} \\
 k \nu_4 &= n_4 \\
 \nu_5 &= n_5
 \end{aligned} \\
 \text{II.} & \begin{aligned}
 k \nu_1 &= n_1 \\
 \nu_2 &= n_2 \\
 k \frac{1 - \nu_3}{2} &= \frac{k - n_3}{2} \\
 k \frac{1 + \nu_3}{2} &= \frac{k + n_3}{2} \\
 k^2 \nu_4 &= n_4 + i n_1 \\
 k \nu_5 &= n_5 - i n_2
 \end{aligned} \\
 \text{III.} & \begin{aligned}
 k \nu_1 &= n_1 \\
 k^2 \nu_2 &= n_2 + i^2 n_4 - i n_3 + i^1 n_4 \\
 k \frac{1 - \nu_3}{2} &= \frac{k - n_3}{2} + i n_4 \\
 k \frac{1 + \nu_3}{2} &= \frac{k + n_3}{2} - i n_4 \\
 \nu_4 &= n_4 \\
 k \nu_5 &= n_5 - i^1 n_4
 \end{aligned}
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 v_1 &= n_1 \\
 k v_2 &= n_2 + i^1 n_1 \\
 k \frac{1 - v_3}{2} &= \frac{k - n_3}{2} - i n_1 \\
 \text{IV. } k \frac{1 + v_3}{2} &= \frac{k + n_3}{2} + i n_1 \\
 k v_4 &= n_4 + i^{11} n_1 \\
 k^2 v_5 &= n_5 - i n_3 - i^1 n_4 + (i^2 - i^1 i^{11}) n_1 - i^{11} n_2.
 \end{aligned}$$

In jedem Falle sind die v durch diese Gleichungen eindeutig bestimmt, da, wie bereits nachgewiesen ist, i , i^1 , i^{11} durch die n immer eindeutig bestimmt sind.

Aehnliche Relationen zwischen den v und den n ergeben die Gleichungen 6), in denen aber

$$\begin{aligned}
 \gamma_3 \delta_0 - \gamma_0 \delta_3 &= v_1 \\
 \alpha_3 \gamma_0 - \alpha_0 \gamma_3 &= v_2 \\
 \alpha_0 \delta_3 - \alpha_3 \delta_0 &= \frac{1 + v_3}{2} \\
 15) \quad \beta_0 \gamma_3 - \beta_3 \gamma_0 &= \frac{1 - v_3}{2} \\
 \beta_0 \delta_3 - \beta_3 \delta_0 &= v_4 \\
 \alpha_3 \beta_0 - \alpha_0 \beta_3 &= v_5
 \end{aligned}$$

zu setzen ist.

Im Allgemeinen giebt es, wenn solche lineare Transformationen, deren Coefficienten nach dem Modul 2 congruent sind, nicht als wesentlich verschieden angesehen werden, 720 wesentlich verschiedene lineare Transformationen (Hermite pag. 27). Die Coefficienten der linearen Transformationen sind aber durch die Gleichungen 14) und 15) weiteren Bedingungen unterworfen. Die Anzahl dieser verschiedenen Transformationen wird somit gleich sein der Anzahl der verschiedenen Lösungen der Gleichungen 14) und 15)

Da die Summe der 3. und 4. Gleichung von 14) gleich ist:

$$\frac{1 - v_3}{2} + \frac{1 + v_3}{2} = 1$$

so muss, wenn die Grösse linker Hand congruent Null nach dem Modull 2 ist, die andere congruent Eins sein. Nimmt man an:

$$\frac{1 + v_3}{2} \equiv 1 \pmod{2}$$

so kann dieser Congruenz durch sechs Annahmen über die Grössen $\beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2$, genügt werden, nämlich:

$$\beta_1 \equiv 1, \beta_2 \equiv 0; \quad \beta_1 \equiv 1, \beta_2 \equiv 0;$$

$$\gamma_1 \equiv 0, \gamma_2 \equiv 1; \quad \gamma_1 \equiv 1, \gamma_2 \equiv 1;$$

$$\beta_1 \equiv 0, \beta_2 \equiv 1; \quad \beta_1 \equiv 0, \beta_2 \equiv 1;$$

$$\gamma_1 \equiv 1, \gamma_2 \equiv 0; \quad \gamma_1 \equiv 1, \gamma_2 \equiv 1;$$

$$\beta_1 \equiv 1, \beta_2 \equiv 1; \quad \beta_1 \equiv 1, \beta_2 \equiv 1;$$

$$\gamma_1 \equiv 0, \gamma_2 \equiv 1; \quad \gamma_1 \equiv 1, \gamma_2 \equiv 0;$$

Durch Festsetzung der Grössen $\beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2$ sind die übrigen Grössen durch die Gleichungen 14) eindeutig bestimmt. Ebenso besitzen die Gleichungen 15) sechs verschiedene Lösungen.

Es giebt somit 36 lineare Transformationen.

Sind $a_1, b_1, c_1, d_1; a_2, b_2, c_2, d_2$ und $a_1, b_1, c_1, d_1; a_2, b_2, c_2, d_2$ zwei ganzzahlige Lösungen der Gleichungen 4), so wird durch die erste Transformation:

$$\begin{aligned} \pi_{m, n, p, q} (x, y, g, h, g^1) &= e^{i\pi(z_0 z_3 + G z_3^2)} \mathcal{V}_{\mu, q}(X, G) \times \\ &e^{i\pi(z_1 z_2 + G^1 z_2^2)} \mathcal{V}_{\nu, p}(Y^1, G^1) \end{aligned}$$

und durch die zweite:

$$\begin{aligned} \pi_{m, n, p, q} (x, y, g, h, g^1) &= e^{i\pi(\mathfrak{z}_0 \mathfrak{z}_3 + \mathfrak{G} \mathfrak{z}_3^2)} \mathcal{V}_{\mu^1, q^1}(\mathfrak{x}, \mathfrak{G}^1) \times \\ &e^{i\pi(\mathfrak{z}_1 \mathfrak{z}_2 + \mathfrak{G}^1 \mathfrak{z}_2^2)} \mathcal{V}_{\nu^1, p^1}(\mathfrak{y}, \mathfrak{G}^1) \end{aligned}$$

worin, wenn k eine ungrade Zahl ist, m, n, p, q mit μ, ν, p, q resp. μ^1, ν^1, p^1, q^1 durch die Congruenzen verbunden sind:

$$16. \left. \begin{aligned} m &\equiv \mu a_0 + \nu a_1 + p a_2 + q a_3 + a_0 a_3 + a_1 a_2 \\ n &\equiv \mu b_0 + \nu b_1 + p b_2 + q b_3 + b_0 b_3 + b_1 b_2 \\ p &\equiv \mu c_0 + \nu c_1 + p c_2 + q c_3 + c_0 c_3 + c_1 c_2 \\ q &\equiv \mu d_0 + \nu d_1 + p d_2 + q d_3 + d_0 d_3 + d_1 d_2 \end{aligned} \right\} \pmod{2}$$

und:

$$17. \left. \begin{aligned} m &\equiv \mu^1 a_0 + \nu^1 a_1 + p^1 a_2 + q^1 a_3 + a_0 a_3 + a_1 a_2 \\ n &\equiv \mu^1 b_0 + \nu^1 b_1 + p^1 b_2 + q^1 b_3 + b_0 b_3 + b_1 b_2 \\ p &\equiv \mu^1 c_0 + \nu^1 c_1 + p^1 c_2 + q^1 c_3 + c_0 c_3 + c_1 c_2 \\ q &\equiv \mu^1 d_0 + \nu^1 d_1 + p^1 d_2 + q^1 d_3 + d_0 d_3 + d_1 d_2 \end{aligned} \right\} \pmod{2}$$

Die Modul G, H, G^1 sind mit den Perioden $\Omega_0, \Omega_1, \Omega_2, \Omega_3$; r_0, r_1, r_2, r_3 durch die Gleichungen verbunden:

$$G = \frac{\Omega_3 r_1 - \Omega_1 r_3}{\Omega_0 r_1 - \Omega_1 r_0}, \quad H = \frac{\Omega_2 r_1 - \Omega_1 r_2}{\Omega_0 r_1 - \Omega_1 r_0},$$

$$G^1 = \frac{\Omega_0 r_2 - \Omega_2 r_0}{\Omega_0 r_1 - \Omega_1 r_0}$$

Ähnliche Gleichungen bestehen zwischen den Modul und Perioden der ursprünglichen Θ -Functionen, nämlich:

$$g = \frac{\omega_3 v_1 - \omega_1 v_3}{\omega_0 v_1 - \omega_1 v_0}, \quad h = \frac{\omega_2 v_1 - \omega_1 v_2}{\omega_0 v_1 - \omega_1 v_0}, \quad g^1 = \frac{\omega_0 v_2 - \omega_2 v_0}{\omega_0 v_1 - \omega_1 v_0}$$

Ausserdem haben die Perioden noch den Gleichungen zu genügen:

$$18. \quad \Omega_0 r_3 - \Omega_3 r_0 + \Omega_1 r_2 - \Omega_2 r_1 = 0$$

$$19. \quad \omega_0 v_3 - \omega_3 v_0 + \omega_1 v_2 - \omega_2 v_1 = 0$$

Aus $H = 0$ folgt:

$$\Omega_2 r_1 - \Omega_1 r_2 = 0$$

daher:

$$\frac{r_1}{\Omega_1} = \frac{r_2}{\Omega_2}$$

Ferner muss wegen Gleichung 18) sein:

$$\Omega_0 r_3 - \Omega_3 r_0 = 0$$

also auch:

$$\frac{r_0}{\Omega_0} = \frac{r_3}{\Omega_3}$$

Somit wird:

$$G = \frac{\Omega_3}{\Omega_0} = \frac{r_3}{r_0}$$

und;

$$G^1 = \frac{\Omega_2}{\Omega_1} = \frac{r_2}{r_1}$$

Zwischen den Perioden der ursprünglichen und transformirten Θ -Functionen bestehen die Gleichungen:

$$\omega_0 = a_0 \Omega_0 + a_1 \Omega_1 + a_2 \Omega_2 + a_3 \Omega_3$$

$$\omega_1 = b_0 \Omega_0 + b_1 \Omega_1 + b_2 \Omega_2 + b_3 \Omega_3$$

$$\omega_2 = c_0 \Omega_0 + c_1 \Omega_1 + c_2 \Omega_2 + c_3 \Omega_3$$

$$\omega_3 = d_0 \Omega_0 + d_1 \Omega_1 + d_2 \Omega_2 + d_3 \Omega_3$$

$$v_0 = a_0 r_0 + a_1 r_1 + a_2 r_2 + a_3 r_3$$

$$v_1 = b_0 r_0 + b_1 r_1 + b_2 r_2 + b_3 r_3$$

$$v_2 = c_0 r_0 + c_1 r_1 + c_2 r_2 + c_3 r_3$$

$$v_3 = d_0 r_0 + d_1 r_1 + d_2 r_2 + d_3 r_3$$

(Hermite pag. 3.)

Setzt man:

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \\ b_0 & b_1 & b_2 & b_3 \\ c_0 & c_1 & c_2 & c_3 \\ d_0 & d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix} = \Delta$$

und bezeichnet die Unterdeterminanten von a_0 mit A_0 etc. so ist:

$$\Omega_0 = \frac{w_0 A_0 + w_1 B_0 + w_2 C_0 + w_3 D_0}{\Delta}$$

Entwickelt man die Unterdeterminanten nach der Verticalreihe mit dem Index 0, so wird mit Rücksicht auf die Gleichungen 7):

$$\Omega_0 = \frac{k}{\Delta} (d_3 w_0 + c_3 w_1 - b_3 w_2 - a_3 w_3)$$

Auf dieselbe Weise ergeben sich :

$$\Omega_1 = \frac{k}{\Delta} (d_2 w_0 + c_2 w_1 - b_2 w_2 - a_2 w_3)$$

$$\Omega_2 = -\frac{k}{\Delta} (d_1 w_0 + c_1 w_1 - b_1 w_2 - a_1 w_3)$$

$$\Omega_3 = -\frac{k}{\Delta} (d_0 w_0 + c_0 w_1 - b_0 w_2 - a_0 w_3)$$

$$r_0 = \frac{k}{\Delta} (d_3 v_0 + c_3 v_1 - b_3 v_2 - a_3 v_3)$$

$$r_1 = \frac{k}{\Delta} (d_2 v_0 + c_2 v_1 - b_2 v_2 - a_2 v_3)$$

$$r_2 = -\frac{k}{\Delta} (d_1 v_0 + c_1 v_1 - b_1 v_2 - a_1 v_3)$$

$$r_3 = -\frac{k}{\Delta} (d_0 v_0 + c_0 v_1 - b_0 v_2 - a_0 v_3)$$

Werden diese Ausdrücke für Ω und r in:

$$G = \frac{\Omega_3}{\Omega_0} = \frac{r_3}{r_0} \text{ und } G^1 = \frac{\Omega_2}{\Omega_1} = \frac{r_2}{r_1}$$

eingesetzt, so nehmen G und G^1 die Werte an:

$$20) \quad G = -\frac{d_0 w_0 + c_0 w_1 - b_0 w_2 - a_0 w_3}{d_3 w_0 + c_3 w_1 - b_3 w_2 - a_3 w_3}$$

$$G = -\frac{d_0 v_0 + c_0 v_1 - b_0 v_2 - a_0 v_3}{d_3 v_0 + c_3 v_1 - b_3 v_2 - a_3 v_3}$$

und

$$21) \quad G^1 = -\frac{d_1 w_0 + c_1 w_1 - b_1 w_2 - a_1 w_3}{d_2 w_0 + c_2 w_1 - b_2 w_2 - a_2 w_3}$$

$$G^1 = -\frac{d_1 v_0 + c_1 v_1 - b_1 v_2 - a_1 v_3}{d_2 v_0 + c_2 v_1 - b_2 v_2 - a_2 v_3}$$

Eliminirt man aus diesen Gleichungen d_0 , so fällt auch d_3 heraus, und es wird:

$$G = - \frac{c_0 (w_1 v_0 - v_1 w_0) - b_0 (w_2 v_0 - v_2 w_0) - a_0 (w_3 v_0 - v_3 w_0)}{c_3 (w_1 v_0 - v_1 w_0) - b_3 (w_2 v_0 - v_2 w_0) - a_3 (w_3 v_0 - v_3 w_0)}$$

$$G^1 = - \frac{c_1 (w_1 v_0 - v_1 w_0) - b_1 (w_2 v_0 - v_2 w_0) - a_1 (w_3 v_0 - v_3 w_0)}{c_2 (w_1 v_0 - v_1 w_0) - b_2 (w_2 v_0 - v_2 w_0) - a_2 (w_3 v_0 - v_3 w_0)}$$

Durch Division des Zählers und Nenners von G und G^1 durch $w_1 v_0 - v_1 w_0$ werden die mit b und a multiplicirten Faktoren resp. gleich g^1 und h . Somit ist:

$$22) \quad G = - \frac{c_0 - b_0 g^1 - a_0 h}{c_3 - b_3 g^1 - a_3 h}$$

$$G^1 = - \frac{c_1 - b_1 g^1 - a_1 h}{c_2 - b_2 g^1 - a_2 h}$$

Werden aber aus den Gleichungen 20) und 21) c_0, c_3 resp. c_1, c_2 eliminirt, so ergibt sich:

$$23) \quad G = - \frac{d_0 - b_0 h - a_0 g}{d_3 - b_3 h - a_3 g}$$

$$G^1 = - \frac{d_1 - b_1 h - a_1 g}{d_2 - b_2 h - a_2 g}$$

Es lassen sich nun vier Zahlen $\varrho, \sigma, \tau, \varphi$ immer so finden, dass ist:

$$a_1 = \varrho a_1 + \sigma a_2, \quad a_2 = \tau a_1 + \varphi a_2,$$

$$b_1 = \varrho b_1 + \sigma b_2, \quad b_2 = \tau b_1 + \varphi b_2,$$

Geht man mit diesen Werten von a_1, a_2, b_1, b_2 in die Gleichungen:

$$a_1 b_2 - a_2 b_1 = \frac{k - n_3}{2}$$

$$b_1 b_2 - b_2 b_1 = n_1$$

und eliminirt aus beiden einmal b_2 , das andere Mal d_1 , so erhält man:

$$b_1 = \varrho d_1 + \sigma d_2 \text{ und } b_2 = \tau d_1 + \varphi d_2$$

Aus der 2. und 4. Gleichung von 4), für die $a_1, b_1, c_1; a_2, b_2, c_2$ ebenfalls eine Lösung ist, folgt:

$$c_1 = \varrho c_1 + \sigma c_2, \quad c_2 = \tau c_1 + \varphi c_2$$

Setzt man die Werte von $a_1, b_1, c_1, d_1; a_2, b_2, c_2, d_2$ in die zweite Gleichung 22) ein, so wird, wenn für die Transformation $a_1, b_1, c_1, d_1; a_2, b_2, c_2, d_2$ der Modul G^1 in G^1 übergeht:

$$G^1 = - \frac{\varrho c_1 + \sigma c_2 - (\varrho b_1 + \sigma b_2) g^1 - (\varrho a_1 + \sigma a_2) h}{\tau c_1 + \varphi c_2 - (\tau b_1 + \varphi b_2) g^1 - (\tau a_1 + \varphi a_2) h}$$

gleich:

$$G^1 = - \frac{\varrho (c_1 - b_1 g^1 - a_1 h) + \sigma (c_2 - b_2 g^1 - a_2 h)}{\tau (c_1 - b_1 g^1 - a_1 h) + \varphi (c_2 - b_2 g^1 - a_2 h)}$$

daher:

$$24) \quad \mathfrak{G}^1 = \frac{\varrho \ G^1 - \sigma}{\varphi - \tau \ G^1}$$

Auf dieselbe Weise erhält man aus der ersten Gleichung 22). wenn r, s, t, v , die $\varrho, \sigma, \tau, \varphi$ entsprechenden Substitutionscoefficienten sind:

$$25) \quad \mathfrak{G} = \frac{r \ G - s}{v - t \ G}$$

Eine ebenso einfache Beziehung besteht zwischen den Argumenten der einfachen ϑ -Functionen für zwei verschiedene Lösungen der Gleichungen 4) und 6).

Es ist;

$$\begin{aligned} X &= (a_0 + a_3 \ G) x + (b_0 + b_3 \ G) y \\ Y &= (a_1 + a_2 \ G^1) x + (b_1 + b_2 \ G^1) y \\ \mathfrak{X} &= (a_0 + a_3 \ \mathfrak{G}) x + (b_0 + b_3 \ \mathfrak{G}) y \\ \mathfrak{Y} &= (a_1 + a_2 \ \mathfrak{G}^1) x + (b_1 + b_2 \ \mathfrak{G}^1) y \end{aligned}$$

Werden zunächst in $\mathfrak{Y}$ für a_1, b_1, a_2, b_2 die Werte in a_1, b_1, a_2, b_2 substituirt, so ergibt sich;

$$\begin{aligned} \mathfrak{Y} &= \left\{ \varrho \ a_1 + \sigma \ a_2 + (\tau \ a_1 + \varphi \ a_2) \frac{\varrho \ G^1 - \sigma}{\varphi - \tau \ G^1} \right\} x \\ &+ \left\{ \varrho \ b_1 + \sigma \ b_2 + (\tau \ b_1 + \varphi \ b_2) \frac{\varrho \ G^1 - \sigma}{\varphi - \tau \ G^1} \right\} y \end{aligned}$$

gleich:

$$\begin{aligned} \mathfrak{Y} &= \frac{(\varrho \ a_1 + \sigma \ a_2) (\varphi - \tau \ G^1) + (\tau \ a_1 + \varphi \ a_2) (\varrho \ G^1 - \sigma)}{\varphi - \tau \ G^1} x \\ &+ \frac{(\varrho \ b_1 + \sigma \ b_2) (\varphi - \tau \ G^1) + (\tau \ b_1 + \varphi \ b_2) (\varrho \ G^1 - \sigma)}{\varphi - \tau \ G^1} y \\ \mathfrak{Y} &= \frac{a_1 + a_2 \ G^1}{\varphi - \tau \ G^1} x + \frac{b_1 + b_2 \ G^1}{\varphi - \tau \ G^1} y \end{aligned}$$

somit:

$$26) \quad \mathfrak{Y} = \frac{Y}{\varphi - \tau \ G^1}$$

In gleicher Weise ist:

$$27) \quad \mathfrak{X} = \frac{X}{\varphi - \tau \ G^1}$$

Die Relationen 24), 26) und 25), 27) stimmen mit den Bedingungen überein, denen die Modul und Argumente zweier elliptischer ϑ -Functionen genügen müssen, damit die eine eine Transformation der anderen ist (Königsberger: Transformation der ellipt. Functionen pag. 23). falls die Substitutionscoefficienten $\varrho, \sigma, \tau, \varphi$ und r, s, t, v ganze Zahlen sind.

Es ist:

$$\begin{aligned} \varrho &= \frac{a_1 b_2 - a_2 b_1}{n_5}, & \tau &= \frac{a_2 b_2 - a_2 b_2}{n_5}, \\ \sigma &= \frac{a_1 b_1 - a_1 b_1}{n_5}, & \varphi &= \frac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{n_5}. \end{aligned}$$

Diese Ausdrücke für ϱ , σ , τ , φ können in eine andere Gestalt gebracht werden. Aus den Gleichungen γ) und δ) von 8) und 9) folgt:

$$\begin{aligned} \frac{1}{k} \left(-a_1 n_4 + d_1 n_5 + b_1 \frac{k + n_3}{2} \right) &= b_1 \\ \frac{1}{k} \left(-c_1 n_5 + b_1 n_2 + a_1 \frac{k - n_3}{2} \right) &= a_1 \\ \frac{1}{k} \left(-a_2 n_4 + d_2 n_5 + b_2 \frac{k + n_3}{2} \right) &= b_2 \\ \frac{1}{k} \left(-c_2 n_5 + b_2 n_2 + a_2 \frac{k - n_3}{2} \right) &= a_2 \end{aligned}$$

Werden für a_1 , b_1 , a_2 , b_2 in ϱ , σ , τ , φ die linken Seiten dieser Gleichungen substituirt, so wird zunächst:

$$\begin{aligned} \varrho &= \frac{1}{n_5 k} \left\{ a_1 \left(-a_2 n_4 + d_2 n_5 + b_2 \frac{k + n_3}{2} \right) \right. \\ &\quad \left. - b_1 \left(-c_2 n_5 + b_2 n_2 + a_2 \frac{k - n_3}{2} \right) \right\} \end{aligned}$$

Die Gleichungen 7), 8), 9), 10) bestehen aber auch für die Lösung a_1 , b_1 , c_1 , d_1 ; a_2 , b_2 , c_2 , d_2 , daher ist auch:

$$\begin{aligned} \frac{1}{k} \left(-a_1 n_4 + d_1 n_5 + b_1 \frac{k + n_3}{2} \right) &= b_1 \\ \frac{1}{k} \left(-c_1 n_5 + b_1 n_2 + a_1 \frac{k - n_3}{2} \right) &= a_1 \\ \frac{1}{k} \left(-a_2 n_4 + d_2 n_5 + b_2 \frac{k + n_3}{2} \right) &= b_2 \\ \frac{1}{k} \left(-c_2 n_5 + b_2 n_2 + a_2 \frac{k - n_3}{2} \right) &= a_2 \end{aligned}$$

Substituirt man nun in:

$$\varrho = \frac{a_1 b_2 - a_2 b_1}{n_5}$$

für a_1 , b_1 diese Werte, so wird:

$$\begin{aligned} \varrho &= \frac{1}{n_5 k} \left\{ b_2 \left(-c_1 n_5 + b_1 n_2 + a_1 \frac{k - n_3}{2} \right) \right. \\ &\quad \left. - a_2 \left(-a_1 n_4 + d_1 n_5 + b_1 \frac{k + n_3}{2} \right) \right\} \end{aligned}$$

Die Addition dieser so erhaltenen Werte von ϱ ergibt

$$2 \varrho = \frac{1}{n_5 k} \left\{ (a_1 d_2 + b_1 c_2 - c_1 b_2 - d_1 a_2) n_5 + (a_1 b_2 - a_2 b_1) k \right\}$$

daher:

$$\varrho = \frac{1}{k} (a_1 d_2 + b_1 c_2 - c_1 b_2 - d_1 a_2)$$

Analog erhält man:

$$\sigma = \frac{1}{k} (a_1 d_1 + b_1 c_1 - c_1 b_1 - d_1 a_1)$$

$$\tau = \frac{1}{k} (a_2 d_2 + b_2 c_2 - c_2 b_2 - d_2 a_2)$$

$$\varphi = \frac{1}{k} (a_2 d_1 + b_2 c_1 - c_2 b_1 - d_2 a_1)$$

Damit ϱ , σ , τ , φ ganze Zahlen sind, müssen

$$a_1 d_2 + b_1 c_2 - c_1 b_2 - d_1 a_2$$

$$a_1 d_1 + b_1 c_1 - c_1 b_1 - d_1 a_1$$

$$a_2 d_2 + b_2 c_2 - c_2 b_2 - d_2 a_2$$

$$a_2 d_1 + b_2 c_1 - c_2 b_1 - d_2 a_1$$

durch k teilbar sein.

Die Gleichung 8) α) in den deutschen Buchstaben lässt sich schreiben:

$$b_1 n_1 + c_1 n_4 - d_1 \frac{k - n_3}{2} = -d_1 k$$

Substituirt man aus den Gleichungen 4) für die n ihre Werte in den lateinischen Buchstaben, so erhält man:

$$b_1 (c_1 d_2 - c_2 d_1) + c_1 (d_1 b_2 - d_2 b_1) - d_1 (a_1 d_2 - a_2 d_1) = -d_1 k$$

Auf der linken Seite $a_1 d_1 d_2$ addirt und subtrahirt, giebt:

$$28) d_2 (b_1 c_1 - c_1 b_1 - d_1 a_1 + a_1 d_1) - d_1 (b_1 c_2 - c_1 b_2 - d_1 a_2 + a_1 d_2) = -d_1 k.$$

Auf dieselbe Weise lassen sich aus den andern drei Gleichungen von 8) und den Gleichungen 9) in den deutschen Buchstaben die Gleichungen ableiten;

$$29) c_1 (b_1 c_2 - c_1 b_2 - d_1 a_2 + a_1 d_2) - c_2 (b_1 c_1 - c_1 b_1 - d_1 a_1 + a_1 d_1) = c_1 k$$

$$30) b_2 (b_1 c_1 - c_1 b_1 - d_1 a_1 + a_1 d_1) - b_1 (b_1 c_2 - c_1 b_2 - d_1 a_2 + a_1 d_2) = -b_1 k$$

$$31) a_2 (b_1 c_1 - c_1 b_1 - d_1 a_1 + a_1 d_1) - a_1 (b_1 c_2 - c_1 b_2 - d_1 a_2 + a_1 d_2) = -a_1 k$$

$$32) d_2 (b_2 c_1 - c_2 b_1 - d_2 a_1 + a_2 d_1) - d_1 (b_2 c_2 - c_2 b_2 - d_2 a_2 + a_2 d_2) = -d_2 k$$

$$33) \quad c_1 (b_2 c_2 - c_2 b_2 - b_2 a_2 + a_2 d_2) - c_2 (b_2 c_1 - c_2 b_1 - b_2 a_1 + a_2 d_1) = c_2 k$$

$$34) \quad b_2 (b_2 c_1 - c_2 b_1 - b_2 a_1 + a_2 d_1) - b_1 (b_2 c_2 - c_2 b_2 - b_2 a_2 + a_2 d_2) = -b_2 k$$

$$35) \quad a_2 (b_2 c_1 - c_2 b_1 - a_2 d_1 + b_2 a_1) - a_1 (b_2 c_2 - c_2 b_2 - b_2 a_2 + a_2 d_2) = -a_2 k$$

Die Multiplication der Gleichung 28) mit c_2 und der Gleichung 29) mit d_2 und die Addition beider liefert:

$$36) \quad n_1 (b_1 c_2 - c_1 b_2 - b_1 a_2 + a_1 d_2) = k (c_1 d_2 - c_2 b_1)$$

Ebenso ergeben die Gleichungen 28) und 30), 28) und 31), 29) und 31) und endlich 30) und 31):

$$37) \quad n_4 (b_1 c_2 - c_1 b_2 - b_1 a_2 + a_1 d_2) = k (c_1 d_2 - c_2 b_1)$$

$$38) \quad \frac{k}{2} - \frac{n_3}{2} (b_1 c_2 - c_1 b_2 - b_1 a_2 + a_1 d_2) = k (a_1 d_2 - a_2 b_1)$$

$$39) \quad n_2 (b_1 c_2 - c_1 b_2 - b_1 a_2 + a_1 d_2) = k (a_1 c_2 - a_2 c_1)$$

$$40) \quad n_5 (b_1 c_2 - c_1 b_2 - b_1 a_2 + a_1 d_2) = k (a_1 b_2 - a_2 b_1)$$

Die rechten Seiten dieser Gleichungen sind durch k teilbar, darum müssen es auch die linken sein. Die n können nicht sämtlich k enthalten, weil sie keinen gemeinschaftlichen Faktor besitzen. Es muss daher:

$b_1 c_2 - c_1 b_2 - b_1 a_2 + a_1 d_2$
durch k teilbar sein. Somit ist q eine ganze Zahl.

Auf dieselbe Weise lässt sich mit Hilfe der Gleichungen 28) — 35) die Ganzzahligkeit von σ , τ , φ nachweisen.

Um den Grad der Transformation festzustellen, geht man mit dem Werte der Lösung $a_1, b_1, c_1, d_1; a_2, b_2, c_2, d_2$ in die Gleichung:

$$a_1 b_2 - a_2 b_1 = n_5$$

Man erhält:

$$(q \varphi - \sigma \tau) (a_1 b_2 - a_2 b_1) = n_5$$

Da nun auch:

$$a_1 b_2 - a_2 b_1 = n_5$$

so muss sein:

$$q \varphi - \sigma \tau = 1$$

Die Transformation ist somit eine lineare.

Damit nun

$$\vartheta_{\nu^1, p^1}(\mathcal{Y}, \mathcal{G}^1) \text{ und } \vartheta_{\mu^1, q^1}(\mathcal{X}, \mathcal{G})$$

durch diese lineare Transformation in

$$\vartheta_{\nu, p}(Y, G^1) \text{ resp. } \vartheta_{\mu, q}(X, G)$$

übergeht, müssen ν, p, μ, q durch ν^1, p^1, μ^1, q^1 und die Transformations-Coefficienten ausdrückbar sein. Aus den Congruenzen 16) und 17) folgt:

$$\begin{aligned} \mu a_0 + \nu a_1 + p a_2 + q a_3 + a_0 a_3 + a_1 a_2 &\equiv \mu^1 a_0 + \nu^1 a_1 \\ &+ p^1 a_2 + q^1 a_3 + a_0 a_3 + a_1 a_2 \pmod{2} \end{aligned}$$

Führt man in die rechte Seite dieser Congruenz die Substitutionen ein:

$$a_0 = r a_0 + s a_3, \quad a_1 = \varrho a_1 + \sigma a_2,$$

$$a_3 = t a_0 + v a_3, \quad a_2 = \tau a_1 + \varphi a_2,$$

so geht sie über in:

$$\equiv \mu^1 (r a_0 + s a_3) + \nu^1 (\varrho a_1 + \sigma a_2) + p^1 (\tau a_1 + \varphi a_2) + q^1 (t a_0 + v a_3) + (r a_0 + s a_3) (t a_0 + v a_3) \\ + (\varrho a_1 + \sigma a_2) (\tau a_1 + \varphi a_2) \pmod{2}$$

$$\equiv a_0 (r \mu^1 + t q^1) + a_1 (\varrho \nu^1 + \tau p^1) + a_2 (\sigma \nu^1 + \varphi p^1) + a_3 (s \mu^1 + v q^1) + r t a_0^2 + (s t + \nu v) a_0 a_3 + \\ s v a_3^2 + \varrho \tau a_1^2 + (\sigma \tau + \varrho \varphi) a_1 a_2 + \sigma \varphi a_2^2 \pmod{2}$$

Nun ist:

$$r t a_0^2 \equiv r t a_0 \pmod{2}$$

$$s v a_3^2 \equiv s v a_3 \pmod{2}$$

$$\varrho \tau a_1^2 \equiv \varrho \tau a_1 \pmod{2}$$

$$\sigma \varphi a_2^2 \equiv \sigma \varphi a_2 \pmod{2}$$

und:

$$r v = 1 + s t$$

$$\varrho \varphi = 1 + \sigma \tau$$

daher:

$$\equiv a_0 (r \mu^1 + t q^1 + r t) + a_1 (\varrho \nu^1 + \tau p^1 + \varrho \tau) \\ + a_2 (\sigma \nu^1 + \varphi p^1 + \sigma \varphi) + a_3 (s \mu^1 + v q^1 + s v) \\ + (1 + 2 s t) a_0 a_3 + (1 + 2 \sigma \tau) a_1 a_2 \pmod{2}$$

Da nun:

$$2 s t a_0 a_3 \equiv 2 \sigma \tau a_1 a_2 \equiv 0 \pmod{2}$$

ist, so können diese Glieder weggelassen werden, ohne dass dadurch die Congruenz eine Aenderung erleidet. Subtrahirt man nun noch auf beiden Seiten $a_0 a_3 + a_1 a_2$, so ergibt sich endlich:

$$41) \mu a_0 + \nu a_1 + p a_2 + q a_3 \equiv a_0 (r \mu^1 + t q^1 + r t) \\ + a_1 (\varrho \nu^1 + \tau p^1 + \varrho \tau) + a_2 (\sigma \nu^1 + \varphi p^1 + \sigma \varphi) + a_3 (s \mu^1 + v q^1 + s v) \pmod{2}$$

Aus den übrigen Congruenzen 16) und 17) findet man auf demselben Wege:

$$42) \mu b_0 + \nu b_1 + p b_2 + q b_3 \equiv b_0 (r \mu^1 + t q^1 + r t) + b_1 (\varrho \nu^1 + \tau p^1 + \varrho \tau) + b_2 (\sigma \nu^1 + \varphi p^1 + \sigma \varphi) + b_3 (s \mu^1 + v q^1 + s v) \pmod{2}$$

$$43) \mu c_0 + \nu c_1 + p c_2 + q c_3 \equiv c_0 (r \mu^1 + t q^1 + r t) + c_1 (\varrho \nu^1 + \tau p^1 + \varrho \tau) + c_2 (\sigma \nu^1 + \varphi p^1 + \sigma \varphi) + c_3 (s \mu^1 + v q^1 + s v) \pmod{2}$$

$$44) \mu d_0 + \nu d_1 + p d_2 + q d_3 \equiv d_0 (r \mu^1 + t q^1 + r t) + d_1 (\varrho \nu^1 + \tau p^1 + \varrho \tau) + d_2 (\sigma \nu^1 + \varphi p^1 + \sigma \varphi) + d_3 (s \mu^1 + v q^1 + s v) \pmod{2}$$

Multipliziert man nun die Gleichung 41) mit d_3 , 42) mit c_3 , 43) mit $-b_3$ und 44) mit $-a_3$ und addirt sie, so er-

hält man mit Rücksicht auf das Gleichungssystem 2):

$$k \mu \equiv k (r \mu^1 + t q^1 + r t) \pmod{2}$$

Da nun k eine ungrade Zahl ist, so kann man diese Congruenz durch k dividiren, und es ist somit:

$$\mu \equiv r \mu^1 + t q^1 + r t \pmod{2}$$

Aehnlich ergibt sich:

$$\left. \begin{aligned} \nu &\equiv \varrho \nu^1 + \tau p^1 + \varrho \tau \\ p &\equiv \sigma \nu^1 + \varphi p^1 + \sigma \varphi \\ q &\equiv s \mu^1 + v q^1 + s v \end{aligned} \right\} \pmod{2}$$

Diese Congruenzen sind den zwischen den Indices der ursprünglichen und transformirten ϑ -Function bestehenden Gleichungen analog gebildet. (Königsberger: Transformation der elliptischen ϑ -Functionen pag. 24)

Es sind somit alle Bedingungen erfüllt, die zwischen zwei elliptischen ϑ -Functionen bestehen, wenn die eine eine lineare Transformation der anderen ist. Es ist also:

$$e^{i\pi(\varrho + \tau \mathfrak{G}^1)\tau Y^2} \vartheta_{\nu^1, p^1}(\mathfrak{Y}, \mathfrak{G}^1) = C \vartheta_{\nu, p}(Y, G^1)$$

Eine ähnliche Gleichung existirt für $\vartheta_{\mu^1, q^1}(\mathfrak{X}, \mathfrak{G})$.

Multiplicire ich nun beide Seiten dieser Gleichung mit

$$e^{i\pi(z_1 z_2 + z_2^2 G^1)}$$

, so wird:

$$\begin{aligned} e^{i\pi[(\varrho + \tau \mathfrak{G}^1)\tau Y^2 + z_1 z_2 + z_2^2 G^1]} \vartheta_{\nu^1, p^1}(\mathfrak{Y}, \mathfrak{G}^1) \\ = C e^{i\pi(z_1 z_2 + z_2^2 G^1)} \vartheta_{\nu, p}(Y, G^1) \end{aligned}$$

Da nun $z_1 z_2 + z_2^2 G^1 = z_2 Y$ ist, so wird:

$$(\varrho + \tau \mathfrak{G}^1)\tau Y^2 + z_1 z_2 + z_2^2 G^1 = (\varrho + \tau \mathfrak{G}^1)\tau Y^2 + z_2 Y.$$

Nun folgt aus der Gleichung 26)

$$\begin{aligned} Y &= (\varphi - \tau G^1) \mathfrak{Y}, \\ \text{daher: } (\varrho + \tau \mathfrak{G}^1)\tau Y^2 + z_2 Y &= (\varrho + \tau \mathfrak{G}^1)\tau (\varphi - \tau G^1)^2 \mathfrak{Y}^2 \\ &\quad + z_2 (\varphi - \tau G^1) \mathfrak{Y}. \end{aligned}$$

Setzt man für G^1 den aus der Gleichung 24) folgenden Wert ein: nämlich:

$$G^1 = \frac{\sigma + \varphi \mathfrak{G}^1}{\varrho + \tau \mathfrak{G}^1}$$

so wird:

$$\begin{aligned} (\varrho + \tau \mathfrak{G}^1)\tau Y^2 + z_2 Y &= (\varrho + \tau \mathfrak{G}^1)\tau \left(\varphi - \tau \frac{\sigma + \varphi \mathfrak{G}^1}{\varrho + \tau \mathfrak{G}^1} \right)^2 \mathfrak{Y}^2 \\ &\quad + z_2 \left(\varphi - \tau \frac{\sigma + \varphi \mathfrak{G}^1}{\varrho + \tau \mathfrak{G}^1} \right) \mathfrak{Y} \\ &= \frac{\tau \mathfrak{Y}^2 + z_2 \mathfrak{Y}}{\varrho + \tau \mathfrak{G}^1} \end{aligned}$$

Ferner ist:

$$z_2 = a_2 x + b_2 y$$

Die Coefficienten a_2, b_2 lassen sich aus den Gleichungen

$$a_1 = \varrho a_1 + \sigma a_2, \quad a_2 = \tau a_1 + \varphi a_2,$$

$$b_1 = \varrho b_1 + \sigma b_2, \quad b_2 = \tau b_1 + \varphi b_2,$$

durch a_1, b_1, a_2, b_2 , ausdrücken. Substituirt man die sich ergebenden Werte:

$$a_2 = \varrho a_2 - \tau a_1,$$

$$b_2 = \varrho b_2 - \tau b_1,$$

in z_2 , so erhält man:

$$z_2 = (\varrho a_2 - \tau a_1) x + (\varrho b_2 - \tau b_1) y$$

gleich:

$$z_2 = \varrho \beta_2 - \tau \beta_1$$

Daher:

$$(\varrho + \tau \mathfrak{G}^1) \tau Y^2 + z_2 Y = \frac{\tau \mathfrak{Y}^2 + (\varrho \beta_2 - \tau \beta_1) \mathfrak{Y}}{\varrho + \tau \mathfrak{G}^1}$$

Da aber:

$$\mathfrak{Y} = \beta_1 + \beta_2 \mathfrak{G}^1$$

ist, so ergibt sich schliesslich nach einigen Reductionen

$$(\varrho - \tau \mathfrak{G}^1) \tau Y^2 + z_2 Y = \beta_1 \beta_2 + \beta_2^2 \mathfrak{G}^1$$

Daher ist:

$$\underset{e}{i \pi (\beta_1 \beta_2 + \beta_2^2 \mathfrak{G}^1)} \mathscr{V}_{\nu^1, p^1}(\mathfrak{Y}, \mathfrak{G}^1) = C e^{i \pi (z_1 z_2 + z_2^2 G^1)} \mathscr{V}_{\nu, p}(Y, G^1)$$

Ebenso wird die Relation:

$$\underset{e}{i \pi (\beta_0 \beta_3 + \beta_3^2 \mathfrak{G})} \mathscr{V}_{\mu^1, q^1}(\mathfrak{X}, \mathfrak{G}) = C^1 e^{i \pi (z_0 z_2 + z_3^2 G)} \mathscr{V}_{\mu, q}(X, G)$$

abgeleitet.

Es unterscheiden sich somit die *II*-Functionen mit denselben Indices für verschiedene Lösungen der Gleichungen 4) und 6) nur um eine multiplicative Constante und können durch lineare Transformationen der einfachen $\mathfrak{P}$ -Functionen, in deren Product sie zerfallen, auseinander abgeleitet werden.

Die Function *II* (x, y) ist eine ganze homogene Function k ten Grades von vier ursprünglichen Θ -Functionen (Hermite pag. 22) Setzt man nun diejenige *II*-Function, die aus $\Theta_{1,1,1,1}$ gebildet ist, gleich Null, so erhält man für jede Transformation, die den Gleichungen 4) und 6) genügt, eine homogene Gleichung k ten Grades zwischen den ursprünglichen Θ -Functionen. Diese *II*-Function wird aber gleich Null, wenn man in den ursprünglichen Θ -Functionen die k ten Teile der Periodenindices

als Argumente nimmt, wodurch die Argumente der H -Function gleich den ganzen Perioden werden (Königsberger: Transf. 2. Grades der Abelschen Functionen. Crelle 67 pag. 65).

Es soll nun diese Gleichung zwischen den gegebenen Θ -Functionen mit k ten Theilen der Periodenindices als Argumente durch die Coefficienten n_1, n_2, n_3, n_4, n_5 eine bestimmte sein.

Die Indices dieser H -Function ergeben sich aus den Congruenzen 16), indem man $\mu = \nu = p = q = 1$ setzt. Es ist somit:

$$\left. \begin{aligned} m &\equiv a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_0 a_3 + a_1 a_2 \\ n &\equiv b_0 + b_1 + b_2 + b_3 + b_0 b_3 + b_1 b_2 \\ p &\equiv c_0 + c_1 + c_2 + c_3 + c_0 c_3 + c_1 c_2 \\ q &\equiv d_0 + d_1 + d_2 + d_3 + d_0 d_3 + d_1 d_2 \end{aligned} \right\} \pmod{2}$$

Man kann schreiben:

$$m \equiv (a_1 + a_2 + a_1 a_2) + (a_0 + a_3 + a_0 a_3) \pmod{2}$$

Es ist

$$a_1 + a_2 + a_1 a_2 \equiv 1 \pmod{2}$$

ausser wenn a_1 und a_2 gleichzeitig gerade sind. In diesem Falle sind auch $\frac{k - n_3}{2}$, n_2 und n_5 gerade Zahlen. Wenn

$\frac{k - n_3}{2}$, n_2 , n_5 gerade sind, so kann man aus den Gleichungen $\delta)$ von 8) und 9) leicht folgern, dass a_1 und a_2 gerade Zahlen sind, weil $\frac{k + n_3}{2}$ ungerade sein muss; denn:

$$\frac{k - n_3}{2} + \frac{k + n_3}{2} = k$$

und k ist als ungerade vorausgesetzt. Ebenso leicht lässt sich aus den Werten von n_1, n_2, n_3, n_4, n_5 feststellen, ob $b_1, b_2; c_1, c_2; d_1, d_2$ gleichzeitig gerade sind oder nicht. Dieselbe Betrachtung ist anwendbar auf die Coefficienten mit den Indices 0 und 3. Somit sind die Indices m, n, p, q durch die Werte der n bestimmt; und da sich ausserdem alle H -Functionen mit denselben Indices für die verschiedenen Lösungen der Gleichungen 4) nur durch einen constanten Faktor unterscheiden, so muss die Gleichung zwischen den gegebenen Θ -Functionen durch die Coefficienten n_1, n_2, n_3, n_4, n_5 bestimmt sein.

Erhaltene Resultate.

1) Durch das Verschwinden des zweiten Moduls der transformirten Θ -Function werden die Transformationscoefficienten Gleichungen unterworfen, die ganzzahlig lösbar sind.

2) Wenn k eine Primzahl ist, so ist aus den Werten von n_1, n_2, n_3, n_4, n_5 leicht zu erkennen, welchem Repräsentanten die Transformationen, die hyperelliptische Functionen auf elliptische reduciren, äquivalent sind. Keine dieser Transformationen kann selbst ein Repräsentant sein. Die Anzahl der in eine Klasse gehörenden Transformationen ist 36.

3) Ist k eine beliebige ungrade Zahl, so stehen die II -Functionen mit demselben Index, die man für verschiedene der in Rede stehenden Transformationen erhält, in dem Zusammenhang, dass sie sich nur durch eine multiplicative Constante unterscheiden und aus einander durch lineare Transformationen derjenigen einfachen ϑ -Functionen entstehen, in deren Product wegen des Verschwindens des mittleren Moduls die transformirte Θ -Function zerfällt.

4) Die Gleichung zwischen den ursprünglichen Θ -Functionen mit k ten Theilen der Periodenindices als Argumente, welche man dadurch erhält, dass die mit Θ_{1111} zusammengesetzte II -Function mit den Argumenten verschwindet, ist durch die Coefficienten n_1, n_2, n_3, n_4, n_5 bestimmt.



Lebenslauf.

Ich, Josef Hanel, kath. Confession, bin geboren am 26. März 1857 zu Mährengasse bei Neisse als Sohn des Bauergutsbesitzers S. Hanel zu Mährengasse und seiner Ehefrau Mathilde geb. Krause. Nach Absolvirung der Elementarschule meines Heimaths-ortes und der Realschule I. Ord. zu Neisse, bezog ich mit dem Zeugniss der Reife im April 1877 die hiesige Universität, um mich dem Studium der Mathematik und Naturwissenschaft zu widmen. Ich hörte Vorlesungen bei den Herren Professoren und Docenten: Cohn, Dilthey, Dorn, Freudenthal, Galle, Grube, Krause, v. Lasaulx, Liebisch, Meyer, Poleck, Römer, Rosanes, Schottky, Schröter, Weber. Während 5 Semester war ich Mitglied des mathematisch-physikalischen Seminars der Herren Professoren Meyer, Rosanes und Schröter und während eines Semesters arbeitete ich praktisch im physikalischen Institut und im zoologischen Museum, während zwei Semester im mineralogischen Museum. Durch ein Semester nahm ich Teil an dem mineralogischen Collegium. Ferner wurde ich von dem Herrn Minister der geistlichen etc. Angelegenheiten zu der am 28. Februar, 1. und 2. März 1881 abgehaltenen Turnlehrerprüfung zugelassen, in welcher mir die Befähigung zur Leitung der Turn-Uebungen an öffentlichen Unterrichts-Anstalten zuerkannt wurde.

Allen oben genannten Herren Professoren und Docenten, insbesondere den Herren Professoren Dorn, Meyer, Rosanes und Schröter fühle ich mich zu grösstem Danke verpflichtet.

Thesen.

I.

Bei Entwicklung der Theorie der hyperelliptischen Functionen ist von den vierfach periodischen Functionen auszugehen.

II.

Eine Electricitätserregung ist nur durch einen chemischen Process herbeizuführen.

III.

Die Turnspiele sollen einen wesentlichen Bestandtheil des Turnunterrichts an allen Lehranstalten bilden.
